ECOGRAFÍA GINECOLÓGICA

Segunda Parte

Alfredo Del Giaccio

Universidad de Carabobo
FUNDACELAC

UDEM UC

UDEM Vzla

UDEM Vzla

OVARIOS

- Forma elíptica, con el eje mayor normalmente orientado verticalmente, cubierto en su superficie por células cuboideas o columnares denominada epitelio germinal.
- Su estructura interna esta dividida en: corteza externa y médula interna.

OVARIOS

- Se visualizan como estructuras ecogenicas ovaladas a cada lado del útero.
 - Medidas: 1 x 2 x 3 cm
 - Volumen: de 2.5 cc – 21.9 cc.
- En la menopausia el volumen ovárico medio es de 9.1 ml

OVARIOS

- Folículos:
 - Localización periférica
 - Múltiples estructuras anecogénicas
 - Folículo dominante:
 - 20-24 mm
 - Días 8-12
- Cuerpo lúteo:
 - Se desarrolla después de la rotura del folículo y en ocasiones da lugar a un quiste.

0v

ovary izquierdo

ovary derecho

Ovary izquierdo

OVARIO

- En la nulípara el ovario esta situado en una depresión en la pared pélvica lateral denominada fosa ovárica.
- Limitada anteriormente por la arteria umbilical obliterada y posteriormente la arteria iliaca interna y el uréter.
Superiormente por la vena iliaca interna

PROTOCOLO DE EXPLORACIÓN

- Se realiza con vejiga urinaria llena.
- Transductores de 3,5 Mhz
- Cortes longitudinales y transversales incluyendo las regiones anexiales derechas e izquierdas.
- Seleccionar imágenes agrandadas del útero desde el fondo hasta el cérvix.

PROTOCOLO DE EXPLORACIÓN

- Medidas del Útero.
- Diámetros
 - Anteroposterior en el eje longitudinal.
 - Transversal en el plano axial o coronal.
 - La medida endometrial es AP en un corte longitudinal.
- Imágenes selectivas agrandadas de los ovarios midiendo sus tres dimensiones (largo, ancho, anteroposterior)

PROTOCOLO DE EXPLORACIÓN

- Masas Pélvicas.
- Determinar origen de la masa (útero-ovario)
- Tamaño
- Ecogenicidad (quístico, solida, mixta)
- Obtención de imágenes de cualquier anomalía, masa o líquidos de la pelvis

EXPLORACIÓN ABDOMINAL

El método abdominal visualiza la pelvis entera y proporciona una visión global, pero tiene limitaciones en pacientes incapaces de rellenar su vejiga, en obesas y en úteros en retroversión.

FOLÍCULO PRE-OVULATORIO

- Ciclo espontaneo 18 a 25 mm
- Clomifeno + HMG 32.7 mm
- FSH pura 20.2 mm

SECUENCIA OVULATORIA

FOLÍCULO PREEVULATORIO INMEDIATO

FOLÍCULO PREEVULATORIO INMEDIATO CÚMULO OOPHORUS

VELOCIDAD DE CRECIMIENTO

- Espontaneo
 - 1.43 mm x día
- Inducido FSH pura
 - 1.58 mm x día
- Clomifeno + HMG
 - 1.95 mm x día

SIGNOS PREEVULATORIOS

- Cúmulo oophorus 24 horas
- Patrón dentado 12 horas
- Desdoblamiento granulosa 5 a 12 horas
- Disminución grosor de pared 5 a 12 horas
- Ecos intrafoliculares
 - Preovulatorio
 - Inmediato

CUMULO OOPHORUS – PATRÓN DENTADO – DESDOBLAMIENTO
DE LA GRANULOSA – ADELGAZAMIENTO DE LA PARED

PATRÓN DENTADO

SIGNOS OVULATORIOS

- Brusca desaparición del folículo
- Ecos internos con tres áreas
- Borde irregular
- Líquido presente en Fondo de saco de Douglas
- Signo de la calle líquida

DESAPARICIÓN DEL FOLÍCULO

BORDE IRREGULAR

SIGNO DE LA CALLE LIQUIDA

FRACASO OVULATORIO

- Crecimiento lento
- Menor de 14 mm (día 8 del ciclo)
- Folículo hemorrágico
- Luteinización precoz

FRACASO OVULATORIO | FOLÍCULO LUTEINIZADO

FOLÍCULO LUTEINIZADO EN REABSORCIÓN

OVARIO POLIQUÍSTICO

1.0
2.0
3.0

MONITORIZACIÓN FOLICULAR

OVULÓ

PERSISTE

ECOS INTERNOS

MONITORIZACIÓN FOLICULAR

ECOGRAFÍA DE MASAS ANEXIALES

Nos permite

- Establecer presencia de tumoración pélvica y su origen anatómico.
- Determinar su forma, tamaño y contenido.
- Establecer relaciones con estructuras y tejidos vecinos.
- Revisar y establecer la presencia de anomalías asociadas a procesos malignos
 - Ascitis
 - Metástasis

MASAS PÉLVICAS

Por su origen las clasificamos en:

- Ginecológicas
 - Uterinas
 - Anexiales
- No ginecológicas
 - Urinarias
 - Intestinales
 - Musculares
 - Oseas

CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA | Grupo IOTA

De masas anexiales por ecografía

- **Lesión:** Aquella imagen a ser caracterizada por U.S
- **Septo (Tabique):** Banda de tejido que cruza la lesión de una pared a otra
- **Sólido:** Alta ecogenicidad
- **Papilas:** Proyecciones sólidas de la pared de 3 mm o más de altura
- **Pared Interna:** Regular o irregular
- **Contenido:** Anecoico, efusión, denso

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS (IOTA)

- **Quiste unilocular:** sin papilas ni tabiques en su interior.
- **Quiste unilocular sólido:** componente sólido en su interior o al menos una papila en la pared.
- **Quiste multilocular:** quiste con al menos un septo sin componente sólido (ni papilas).

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS (IOTA)

- **Quiste multilocular sólido:** estructura multilocular con un componente sólido al menos una papila.
- **Tumor sólido:** componente sólido que alcanza mas de 80% de la imagen en estudio.

CARACTERÍSTICAS ECOSONOGRÁFICAS

Imágenes líquidas (quísticas)

- Forma: redonda u ovalada
- Contorno: nítido, ecogénico, liso.

Ecográficamente se describen como anecoicas con reforzamiento de pared posterior

IMAGEN QUÍSTICA

TABIQUES

PAPILAS

CARACTERÍSTICAS ECOSONOGRÁFICAS

Imágenes sólidas

- Formas: variables
- Contornos: poco nítidos
- Contenido: ecogénico
- Pared posterior: no visible (sombra posterior)

NOV 1974 AM

ID: NORKYS

17:50

- 1 51.3 mm
- 2 32.6 mm
- 3 44.8 mm
- 4 53.0 mm

BACK W6
BACK W6

Caliper on first point - ENTER when ready

MASAS OVÁRICAS BENIGNAS

Quistes funcionales

Quistes foliculares

Redondos - Ovalados

Tamaño: 2.5 -5 cm

Superficie lisa y delgadas

Reforzamiento pared posterior

Desaparece en ciclos sucesivos
(quiste folicular funcionante)

Cuerpo lúteo

Irregulares

Contorno ecogénico y engrosado

Contenido hipoecogénico

Ecos internos suaves (quistes
hemorrágicos)

CUERPO LÚTEO POSTOVULATORIO

CLÁSICA IMAGEN DE PANAL DE ABEJA

CUERPO LÚTEO HEMORRÁGICO

D. DERECHO

O. DERECHO

OVARIO IZQUIERDO

TERATOMA QUÍSTICO

- Son muy frecuentes.
- Componen aproximadamente del 15 al 25% de las neoplasias ováricas.
- Entre el 10 y el 15% son bilaterales.
- Están compuestos por las 3 capas germinales: ectodermo, mesodermo y endodermo.

TERATOMA QUÍSTICO

- Predominan generalmente sus elementos ectodérmicos.
- Son virtualmente benignos y también se les denomina quistes dermoides.
- Se ven frecuentemente en los años reproductivos.

0. 120.

O. DERECHO

CARACTERÍSTICAS ECOGRÁFICAS | ENDOMETRIOMAS

- Uni o bilaterales
- Forma: redondeadas u ovaladas. Uniloculares o multiloculares.
- Contornos: ecogénicos, gruesos e irregulares
- Ecos mixtos (zonas ecogénicas o ecos suaves difusos por presencia de sangre)
- No dan sombra posterior
- Diferenciar con cuerpo lúteo

IMAGEN EN NEVADO

ECOGRAFÍA PÉLVICA TRANSABDOMINAL

ENFERMEDAD DEL OVARIO POLI QUÍSTICO

- Entidad endocrinológica compleja que da lugar a anovulación crónica.
- Ovarios aumentados de tamaño.
- Múltiples folículos dispersos en todo el estroma.
- Imagen hiperecogénica central con rosario periférico.

ENFERMEDAD DEL OVARIO POLI QUÍSTICO

CARACTERÍSTICAS ECOGRÁFICAS | CISTOADENOMAS

- Uni o bilaterales
- 10% tumores borderline
- 10% pueden malignizarse
- Frecuentes en la menopausia

CARACTERÍSTICAS ECOGRÁFICAS | CISTOADENOMAS

- Las imágenes pueden ser quísticas o complejas (serosas o mucinosas)
- En su contenido pueden presentar ecos suaves, tabiques, (multiloculados) y sus paredes internas pueden ser lisas o con papilas y excrescencias.

TABIQUES

CISTOADENOMA MUCINOSO

Tabiques delgados y gruesos

CÁNCER DE OVARIO

- Es la cuarta causa de muerte por cáncer entre las mujeres.
- Constituye 25% de todas las malignidades ginecológicas.
- Su pico de incidencia es en la sexta década de la vida.

CÁNCER DE OVARIO

- Tiene la tasa de mortalidad mas elevada como consecuencia del diagnóstico tardío.
- Tiene pocos síntomas clínicos.
- Aproximadamente entre el 60 y 70% de las mujeres tienen enfermedad avanzada al momento del diagnóstico.
- La tasa de supervivencia a los 5 años es del 20 al 30%.

CÁNCER DE OVARIO

TIPO	INCIDENCIA	EJEMPLO
Tumores epiteliales-estromales de superficie.	65-75%	Cistoadenoma seroso. Cistoadenoma mucinoso. Carcinoma endometriode Carcinoma de células claras. Tumor de células transicionales.
Tumor de Células Germinales	15-20%	Teratoma: •Dermoide •Inmaduro. Disgerminoma. Tumor del saco vitelino.
Tumores Estromales – de los cordones sexuales.	5-10%	Tumores de las células de la granulosa. Tumor de células de Sertoli-Leydig. Tecoma y fibroma.
Tumores Metastásicos.	5-10%	Primario genital uterino. Primario Extragenital: •Estomago, Colon, Mama y Linfoma.

D 33.5mm 13.0mm
FREE 10

TUMORES MALIGNOS

O. DERECHO

MASA OVÁRICA

3D Volume

Dia: 82.5 mm

Dia: 87.6 mm

Dia: 0.0 mm

V: 0.00 cm³

3D Volume

Dia: 110.9 mm

Dia: 0.0 mm

Dia: 0.0 mm

V: 0.00 cm³

ASCITIS

D 1: 83.8 mm
D 2: 39.4 mm
D: 0.0 mm

D 1: 42.4 mm
D 2: 50.1 mm
D: 0.0 mm

METÁSTASIS PERITONEAL

VEJIGA URINARIA

- Linfoma vesical primario:
- Se origina en folículos linfáticos submucosos y no suele infiltrar otras capas de la vejiga.
- Pacientes de 40 a 60 años.
- Afecta mas mujeres que hombres.

VEJIGA URINARIA

- Ecográficamente
 - Masa en la pared vesical normalmente cubierta por un epitelio intacto.
 - Si la masa es grande puede ulcerarse.

METÁSTASIS VESICALES

- Pueden deberse a melanomas, carcinomas de pulmón, de estómago o de mama.

Ecográficamente:
Una masa solida
en pared vesical.

TUMORES MESENQUIMALES DE LA VEJIGA

- Son poco frecuentes.
- Son el 1% de los tumores vesicales.
- Clasificación:
 - Benignos: leiomiomas, neurofibroma, hemangioma cavernoso y feocromocitoma vesical.
 - Malignos: leiomiosarcoma y el rabdomiosarcoma.

LEIOMIOMA

- Tumor vesical benigno más frecuente.
- Se origina en la submusoca cerca del triángulo vesical.
- Puede tener crecimiento:
 - Intravesical (63%)
 - Intramural (3%)
 - Extravesical (30%)

LEIOMIOMA

Ecográficamente:

- Masa sólida redondeada u ovalada bien definida.
- Pueden tener degeneración quística.

NEUROFIBROMA

- Pueden ser un hallazgo aislado o asociarse a una enfermedad sistémica.

Ecográficamente:

- Son similares a los leiomiomas.
- Hemangioma cavernoso
- Se localizan en cúpula vesical y en pared posterior de la vejiga.

NEUROFIBROMA

Ecográficamente:

- Masa intraluminal redondeada, bien definida, solida, hiperecogenica.
- Muy vascularizada al Doppler color.
- Engrosamiento difuso de la pared con múltiples áreas hipoecogenicas y calcificaciones.

MASA EXCRECENTE EN PARED VESICAL

FEOCROMOCITOMA

- Son raros y representan solo el 1% de todos los feocromocitomas.
- Se origina en el submucosa.
- Pueden localizarse en cualquier sitio de la vejiga.

Ecográficamente:

- Masa vesical intramural, solida y bien definida.

TUMORES VESICALES MESENQUIMATOSOS MALIGNOS

- Son poco frecuentes.
- El mas frecuente es el leiomiosarcoma y el rabdomiosarcoma.

Ecográficamente:

- Masa grande infiltrante.

RABDOMIOSARCOMA

LEIOMIOSARCOMA

DIPLOMADO
ECOGRAFÍA
INTEGRAL

UDEM UC

UDEM Vzla

UDEM Vzla

UDEM.net.ve